

PERMIT[®]




PROTEZIONE

ERBICIDA
SELETTIVO
A BASE DI
HALOSULFURON
METILE

SPECIFICO
PER RISO E MAIS

NEW

ESTENSIONE
SU MAIS



CONTROLLA CIPERO
E LE INFESTANTI NON GRAMINACEE



PROTEZIONE

PERMIT[®] ERBICIDA SELETTIVO A BASE DI HALOSULFURON METILE



- Può essere applicato su tutte le varietà di riso, sia indica che japonica.
- Attività ottimale quando si interviene su malerbe nei primi stadi di sviluppo ed in fase di attiva crescita.
- Assicura anche un buon controllo iniziale di *Heteranthera* spp., in particolare quando le infestanti si trovano allo stadio di rosetta e nessuna foglia è emersa dall'acqua.
- **Etichetta ampliata per l'uso su mais.**
- **Specifico contro Ciperacee.**



Applicazione sulla pianta



COMPOSIZIONE

HALOSULFURON METILE* g 75
(*Prodotto originale NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES)



FORMULAZIONE

Microgranuli idrodispersibili



REGISTRAZIONE

n. 12706 del 14/12/2007



CLASSIFICAZIONE

CLP H410



CONFEZIONI

150 g



CARENZA

Non richiesta



MISCIBILITÀ E AVVERTENZE

Il prodotto è compatibile con i più comuni diserbanti, impiegati nel controllo delle infestanti del riso e mais.



COLTURE



INFESTANTI CONTROLLATE



PERIODO APPLICAZIONE



DOSE



NOTE

COLTURE	INFESTANTI CONTROLLATE	PERIODO APPLICAZIONE	DOSE	NOTE
RISO	<p>Giavone (<i>Echinochloa</i> spp.) Cipollino (<i>Bolboschoenus maritimus</i>) Quadrettone (<i>Schoenoplectus mucronatus</i>) Zigolo delle risaie (<i>Cyperus difformis</i>) Zigolo dolce (<i>Cyperus esculentus</i>) Erba cucchiaino (<i>Alisma plantago-aquatica</i>) Erba lanceolata (<i>Alisma lanceolata</i>) Ammania arrossata (<i>Ammania coccinea</i>) Forbicina d'acqua (<i>Bidens</i> spp.)</p>	Post-Emergenza	30-50 g/Ha	A partire dalle 2/4 foglie fino al 4° livello di accestimento.
MAIS	<p>Ciperacee, Cencio molle, Forbicina, Farinello, Poligoni, Lappola, Panicum, Digitaria, Echinochloa.</p>	Post-Emergenza	30-50 g/Ha	A partire dallo stadio di 2 fino a 8 foglie.
	<p>Forbicine, Zigolo Tardivo, Poligono Convolvolo, Persicaria.</p> <p>Farinello, Erba Morella, persicaria, Vilucchio Bianco e comune.</p>		15-25 g/Ha	

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.